THE LINDE GROUP

Gebrauchsanweisung

Linde Wundgel 20 ml

für die Sauerstoff- und Beatmungstherapie

Produkteigenschaften

Linde Wundgel ist ein gebrauchsfertiges Hydrogel zur schmerzarmen Anwendung bei Wunden und gereizter Haut und ist geeignet zur Kombination mit Sauerstoff- und Beatmungstherapie. Es hält feucht, bildet einen Schutzfilm und fördert so die Wundheilung. Die Anwendung von Linde Wundgel ist nicht reizend, nicht irritierend und schmerzarm. Es gibt keine Einschränkung in der Anwendungsdauer. Linde Wundgel dient der langfristigen Befeuchtung und Feuchthaltung von Wunden, formt ein ideales Wundheilungsmilieu und unterstützt so den natürlichen Wundheilungsprozess. Das im Linde Wundgel enthaltene Konservierungsmittel (Natriumhypochlorit) hat ein sehr breites Spektrum gegen Bakterien (inkl. Pseudomonas aeruginosa, MRSA/MRE), Viren und Pilze, was eine unspezifische Dekontamination auch bei Wunden ermöglicht.
Wundgerüche werden durch den Einsatz von Linde Wundgel schnell und zuverlässig eliminiert.

Anwendung

Mit dem Linde Wundgel die betroffenen Stellen, z. B. an der Nase, den inneren Seiten des Nasenflügels oder den äußeren Bereich hinter der Ohren, immer großzügig bedecken. Linde Wundgel kann in Kombination mit Kompressen, Pflastern und anderen Verbandmitteln verwendet werden. Es gibt keine Einschränkung in der Häufigkeit und Dauer der Anwendung. Ein leichter Chlorgeruch ist ein Zeichen für die Aktivität der Produkte.
Aus hygienischen Gründen und zur Vermeidung von Kontaminationen sollte Linde Wundgel nur von einem Patienten angewendet werden.

Anwendungsbeispiele

- Druckstellen durch Beatmungsmaske, Sauerstoffbrille und Sauerstoffmaske
- gereizte Haut und oberflächliche Wunden im Nasenbereich, die durch das Tragen der Sauerstoffbrille entstehen

Anwendungseinschränkungen

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt, allergische Reaktionen sind nicht zu erwarten. Linde Wundgel sollte bei bekannten Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe nicht eingesetzt werden.
Nicht gleichzeitig mit anderen wundreinigenden Sprays, Lösungen, Gels und vorgetränkten Kompressen anwenden. Wechselwirkungen mit anderen Substanzen sind nicht zu erwarten. Eine Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit sollte sorgfältig abgewogen werden. Verwenden Sie Linde Wundgel nicht auf blutenden oder stark nässenden Wunden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Nur zur äußerlichen Anwendung bei Hautwunden. Nicht schlucken, Augenkontakt vermeiden.
Vor Kindern sicher aufbewahren. Nur einwandfreie und unbeschädigte Tuben verwenden.
Die Produkte nur bis zu den auf der Tube angegebenen Haltbarkeitsdaten und nach dem Öffnen nicht länger als 12 Wochen verwenden.

Zusammensetzung

Wasser, Natriumhypochlorit <0,06 % (elektrochemisch aktivierte Mineralsalzlösung), Lithium-Magnesium-Natrium-Silikat

Vertrieb durch

Linde Gas Therapeutics GmbH
Mittenheimer Straße 62
D-85764 Oberschleißheim

Stand der Information

2017-08

GBA_Linde_Wundgel_01-2018.indd 1 11.01.18 09:03

THE LINDE GROUP

Instructions for Use

Linde wound gel 20 ml

for oxygen and respiratory therapy

Product properties

Linde wound gel is a ready-to-use hydrogel for a virtually pain-free application to be used on wounds and irritated skin, combined with oxygen and respiratory therapy. It keeps moist, creates a protective film and thus promotes wound healing. The application of Linde wound gel is non-irritating and virtually pain-free, with no restrictions to duration of product use. Linde wound gel adds moisture to the wound, keeps the wound moist and forms an ideal wound healing environment to support the natural wound healing process. The preservative (sodium hypochlorite) contained in Linde wound gel decontaminates a broad spectrum of bacteria (incl. pseudomonas aeruginosa, MRSA/MRE), viruses and fungi. Wound odour is quickly and reliably eliminated when using LINDE wound gel.

Application

Always generously cover the surface of the affected areas, e.g. nose, the inner sides of the nasal wings or the outer area behind the ears with Linde wound gel. Linde wound gel can also be used in combination with compresses, plasters and other dressing material. There are no restrictions regarding the frequency and duration of use. A slight chlorine odour indicates the product is working. For hygienic reasons and to prevent contamination, Linde wound gel should only be used on a single patient.

Application examples

- Pressure points caused by respiratory mask, oxygen cannula and oxygen mask
- Irritated skin and superficial wounds in the nasal area, caused by wearing an oxygen cannula

Application restrictions

There are no known side effects. Linde wound gel should not be used if there are known allergies to any of the ingredients. Do not use in combination with other wound cleaning sprays, solutions, gels and pre-saturated dressings. Interactions with other substances are not expected. During pregnancy and whilst breastfeeding Linde wound gel should be used with caution. Do not use Linde wound gel on bleeding and exuding wounds.

General safety instructions

Only apply to external dermal wounds, do not swallow, avoid eye contact. Keep away from children. Only use intact, undamaged tubes. Only use the products prior to the expiration date indicated on the tube. Once opened, product can only be used for a maximum of 12 weeks.

Ingredients

Water, sodium hypochlorite <0.06 % (electrochemically activated mineral saline solution), Lithium magnesium sodium silicate

Distributed by

Linde Gas Therapeutics GmbH
Mittenheimer Straße 62
D-85764 Oberschleißheim

Date of revision of the text

2017-08

Artikelnummer
Article number

Vor Nässe schützen.
Keep dry.

Nur einwandfreie und unbeschädigte Flaschen verwenden.
Do not use if package is damaged

Vor Anwendung Gebrauchsinformation lesen.
Consult instructions for use.

Flasche vor direkter Sonnenbestrahlung schützen.
Protect bottle from direct sunlight.

Aufbewahrungstemperatur
Temperature limit

Informationsbeilage beachten
Consult information supplement

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Keep out of reach of children.

Hersteller
Manufacturer

Chargenbezeichnung
Batch name

Verwendbar bis:
Jahr und Monat
Expiry date:
Year and Month

Prontomed GmbH
Am Bahndamm 70
32120 Hiddenhausen
Germany

Made in Germany